

INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE SOBRE LA INSTILACIÓN DE BCG

INSTILACIÓN DE BCG DENTRO DE LA VEJIGA

Está a punto de recibir medicación llamado Bacillus Calmette-Guerin (BCG), que es un tipo de inmunoterapia para el cancer de vejiga. Recibira este medicamento insertando un catéter en la vejiga. Una vez que el catéter esté en la vejiga, se instilará el BCG a través del catéter con una jeringuilla. Esto le llama instilación intravesical.

Recibirá este tratamiento una vez a la semana por _____ semanas.

DESPUÉS DE LA INSTILACIÓN

Debe retener el medicamento en la vejiga por 2 horas. Después de las 2 horas, debe sentarse en el inodoro (para evitar salpicaduras) y vaciar completamente la vejiga. Después de orinar, añada 1 taza clorox/bleach al inodoro. Deje que el medicamento, la orina y el clorox permanezcan por 15 minutos antes de vaciar el inodoro. Repite este proceso 6 horas después de la primera micción. Beba mucho líquido durante el día de su tratamiento para enjuagar su vejiga.

EFECTOS SECUNDARIOS

Ardor al orinar	Tos
Urgencia Urinaria	Erupción cutánea
Frecuencia de orinar	Fiebre (101 y superior)
Sangre o coágulos de sangre en la orina	Escalofríos
Dolor en las articulaciones	Cansancio
Síntomas similares a la gripe	

** Cualquier síntoma que no se resuelva dentro de las 24 horas, o si tiene fiebre >101.0F llame a la oficina al 212-305-0114.*

OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE

Las vacunas contra la gripe, la neumonía y COVID no se deben recibir antes de dos semanas después de completar el tratamiento y al menos una semana antes de comenzar el tratamiento.

PROGRAMA DE TRATAMIENTO

Tiempo 0: BCG semanalmente x 6 semanas

Mes #3: Cystoscopia (y posiblemente biopsia); si es normal, BCG semanalmente x 3 semanas

Mes #6: Cystoscopia (y posiblemente biopsia); si es normal, BCG semanalmente x 3 semanas

Mes #9: Cystoscopia (y posiblemente biopsia)

Mes #12: Cystoscopia (y posiblemente biopsia); si es normal, BCG semanalmente x 3 semanas

Mes #15: Cystoscopia (y posiblemente biopsia)

Mes #18: Cystoscopia (y posiblemente biopsia); si es normal, BCG semanalmente x 3 semanas

Mes #21: Cystoscopia (y posiblemente biopsia)

Mes #24: Cystoscopia (y posiblemente biopsia); si es normal, BCG semanalmente x 3 semanas

Despues de mes #24: Cystoscopia (y posiblemente biopsia) cada 6-12 meses según la discreción del médico