

COLUMBIA UNIVERSITY IRVING MEDICAL CENTER

INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE SOBRE LA INSTILACIÓN DE GEMCITABINE Y DOCETAXEL

INSTALACIÓN DE DOCETAXEL EN LA VEJIGA

Está a punto de recibir un medicamento en la vejiga llamado docetaxel, que es una quimioterapia para tratar el cáncer de vejiga. Esto se hace insertando un catéter en la abertura de la uretra y luego en la vejiga. Cuando el catéter esté en la vejiga, se instilará el medicamento (Docetaxel) a través del catéter y luego se retirará el catéter. Esto se llama instilación en la vejiga.

DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN DE DOCETAXEL

Deberá mantener el medicamento en la vejiga durante 1 hora. Después de la hora, debe sentarse en el inodoro para orinar (para evitar salpicaduras) y vaciar completamente la vejiga. Después de orinar, deberá descargar dos veces el inodoro. Informe a la enfermera si se produjo alguna salpicadura para una limpieza adecuada. Para evitar la irritación de la piel, asegúrese de lavarse las manos y los genitales con agua y jabón suave después de eliminar el medicamento en el inodoro.

INSTALACION DE GEMCITABINE EN LA VEJIGA

Luego recibirá un segundo medicamento en la vejiga llamado gemcitabina, que también es una quimioterapia para tratar el cáncer de vejiga. Este medicamento también se colocará en su vejiga a través de un catéter. Una vez que se coloca el medicamento en la vejiga, se retira el catéter. En este momento, puede permanecer en la clínica (área de espera) o puede salir de la clínica.

DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN DE GEMCETABINE

Deberá mantener el medicamento en la vejiga durante 1 hora. Después de la hora, debe sentarse en el inodoro para orinar (para evitar salpicaduras) y vaciar completamente la vejiga. Después de orinar, deberá descargar dos veces el inodoro. Limpie cualquier salpicadura (La lejía o Clorox son agentes de limpieza suficiente). Para evitar la irritación de la piel, asegúrese de lavarse las manos y los genitales con agua y jabón suave después de eliminar medicamento en el inodoro.

Deberá repetir esto durante 6 horas después de la primera micción. Beba muchos líquidos el día de su tratamiento para vaciar la vejiga. En caso de que no pueda retener el medicamento durante 1 hora, informe a su enfermera.

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

Tener molestias al orinar
Sangre o coágulos de sangre en la orina
Desarrollar una infección del tracto urinario
Vómitos

Frecuencia urinaria
Urgencia Urinaria
Fatiga
Escalofríos

* *Cualquier síntoma que no se resuelva dentro de las 24 horas, o si tiene fiebre >101.0F llame a la oficina al 212-305-0114.*

CALENDARIO DE TRATAMIENTO

Recibirá una instalación en la vejiga una vez por semana durante seis semanas y luego su médico le realizará una cistoscopia seis semanas después de finalizar los tratamientos.

Si no hay signos de cáncer en ese momento, su médico puede recomendar dosis mensuales de este medicamento.