

INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE SOBRE LA INSTILACIÓN DE GEMCITABINE

INSTALACIÓN DE GEMCITABINE EN LA VEJIGA

Está a punto de recibir medicamentos en la vejiga; esto se hace insertando un catéter en la abertura de la uretra y luego en la vejiga. Cuando el catéter esté en la vejiga, se instilará el medicamento (Gemcitabine) a través del catéter y luego se retirará el catéter. Esto se llama instilación en la vejiga.

DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

Deberá mantener el medicamento en la vejiga durante 1 hora. Después de la hora, debe sentarse en el inodoro para orinar (para evitar salpicaduras) y vaciar completamente la vejiga. Después de orinar, deberá descargar dos veces la cadena del inodoro y limpiar cualquier salpicadura (la lejía o Clorox son agentes de limpieza suficiente). Deberá repetir esto durante 6 horas después de la primera micción. Beba muchos líquidos el día de su tratamiento para vaciar la vejiga.

Para evitar la irritación de la piel, asegúrese de lavarse las manos y los genitales con agua y un jabón suave después de pasar el medicamento al inodoro.

En caso de que no pueda retener el medicamento durante 1 hora, informe a su enfermera.

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

Tener molestias al orinar
Frecuencia urinaria
Urgencia urinaria
Sangre o coágulos de sangre en la orina
Desarrollar una infección del tracto urinario

Fatiga
Náuseas
Vómitos
Escalofríos

* *Cualquier síntoma que no se resuelva dentro de las 24 horas, o si tiene fiebre >101.0F llame a la oficina al 212-305-0114.*

CALENDARIO DE TRATAMIENTO

Recibirá una instalación en la vejiga una vez por semana durante seis semanas y luego su médico le realizará una cistoscopia seis semanas después de finalizar los tratamientos.

Si no hay signos de cáncer en ese momento, su médico puede recomendar dosis mensuales de este medicamento.